

CASO CLÍNICO DEL FINAL DE LA VIDA A ANALIZAR

Algoritmo para facilitar la reflexión ética de las actuaciones al final de la vida

Intencionalidad

¿Qué se consigue con la acción?

MUERTE DIRECTA

Relación causa-efecto
inmediata

VOLUNTARIA
(Consentida)

MUERTE DIRECTA

Relación causa-efecto
inmediata

NO VOLUNTARIA
(No consentida)

RETIRAR O NO INICIAR
UN TRATAMIENTO
desproporcionado
al beneficio esperado

Es la enfermedad
la que causa la muerte,
no un profesional

BUSCAR EL CONTROL DE SÍNTOMAS

refractarios
a otros tratamientos

No busca
producir la muerte

EUTANASIA / AYUDA AL SUICIDIO

HOMICIDIO

LIMITACIÓN ESFUERZO TERAPEÚTICO

Criterios a valorar:
tolerabilidad, riesgos,
calidad de vida aceptable

Por omisión (de nutrición o hidratación) o
aplicación (de droga letal):
PRODUCE MUERTE DIRECTA

No supone la retirada
de cuidados básicos

Hay síntomas
no controlados

Paciente
SIN síntomas

No indicado
**Actuación
rechazable**

Buena práctica clínica
Actuación aceptable

**Actuación
rechazable**

**Calificación
Ética →**